



na 150 litrů
aplikačního roztoku



Cyracid®

2.0

Granulát – Koncentrát

přípravek na hubení muších larev

CZ Cyracid 2.0 je granulát na hubení všech druhů muších larev. Přípravek okamžitě přerušuje vývojový cyklus much které se vyvíjejí v hnoji nebo v podestýlce chovu skotu, telat, prasat nebo drůbeže. Cyracid 2.0 je schopen likvidovat dokonce i rezistentní kmeny muších larev.

Použití formou políti / postřiku:

Rozpusťte granulát podle uvedené tabulky. Poté aplikujte pomocí kropící konve nebo zádového postřikovače na suché místa, například podestýlku, hlubokou podestýlku, na okrajové části boxů u telata, kolem zdi a pilířů (ve vzdálenosti cca 0,5 metru).

Použití formou rozptýlu: Aplikujte granulát na mokré místa, v nichž se shlukují mušiči larvy, například hnůj, kejdu, kejdivé kanály. **1 měrná lžičice = 15 g**

Dávkování:	Cyracid 2.0	+ voda	dostačující na plochu
Použití formou políti	500 g	15 l	20 m ²
	5 kg	150 l	200 m ²
Použití formou postřiku	500 g	5 l	20 m ²
Použití formou rozptýlu	500 g		20 m ²

Časový harmonogram aplikace: Začněte s první aplikací na začátku letní sezóny, kdy se teplota zvýší na 15°C, nebo po 5 dnech po vykaldání hnoje. Opakujte aplikaci, když podestýlka / hnůj dosáhne výšky cca. 15-20 cm (= přibližně po 14-21 dnech), protože larvy potřebují kyslík a živiny a tím se plazí do horních vrstev. Po 10 až 20 dnech po první aplikaci se populace much významně sníží.

Poznámka: Cyracid 2.0 se musí používat pravidelně a včas. Pouze pečlivá eliminace všech lhníšť much přináší trvalý úspěch. Pro úspěšné hubení dospělých much doporučujeme produkty LD 100 A, LD 100 B nebo LD 100 G

Arthur Schopf GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstr. 1 · 83115 Neubeuern · Germany
Tel. +49(0) 80 35/90 26-0 · www.schopf-hygiene.de

Čištění přístrojů:

Postřikovač nebo konev umijte malým množstvím vody a jaru. Kontaminovanou vodu můžete použít na již ošetřené plochy.

Nakládání s odpady:

Prázdné obaly nelze znovu použít. Nelikvidujte společně s domácím odpadem. Zbytky nevylévejte do dřezu nebo toalet, ale odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

První pomoc:

V případě vdechnutí zajistěte si přísun čerstvého vzduchu, v případě obtíží přivolejte lékaře. 15 minut, přivolejte lékaře.

V případě zasažení očí pootevřete oční víčka a proplachujte oči pod tekoucí vodou po dobu 15 minut, přivolejte lékaře.

V případě požití vypláchněte ústa a napijte se dostatečného množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékaře.

Informace pro lékaře: symptomatická léčba.

Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní pokyny:

P280 Používejte ochranné rukavice.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.

Účinná látka: 20g/kg Cyromazin

Číslo šarže, datum vy'roby a datum spotřeby jsou vtištěny na obalu.

Doba použitelnosti: 3 roky od data vy'roby

Obsah: 1000 g

dostačující
na plochu do
200 m²