

CZ

Ratzia Bag B 25 je rodenticidní přípravek na bázi účinné látky Brodifacoum, ve formě nástrahy k použití pouze v deratizačních stanicích, určen k hubení myši domácí a potkana obecného v interiéru a exteriéru kolem budov, profesionálními uživateli a širokou veřejností. Při použití tohoto přípravku by mělo dojít k vyhubení hlodavců do 35 dnů.

Návod k použití:

Před použitím rodenticidů je třeba zvážit nechemické metody regulace (např. pastí). Před položením nástrahy proveďte průzkum zamořené oblasti a posouzení na místě a určete druh hlodavců, místa jejich aktivity a stanovte pravděpodobnou příčinu a rozsah zamoření. Odstraňte potraviny, které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné (např. rozsypané zrní nebo potravinový odpad). Kromě těchto opatření však zamořenou oblast těsně před zahájením deratizace nečistěte, neboť to populaci hlodavců jen vyruší a ztěžuje to akceptaci nástrahy.

Deratizační stanice umístěte a připevněte k zemi nebo k jiným konstrukcím, v bezprostřední blízkosti míst, kde byla již dříve zaznamenána aktivita hlodavců (např. stezky, hnízdiště, výkrmny, díry, nory atd.). Neumísťujte deratizační stanice v blízkosti drenážních systémů, kde mohou přijít do styku s vodou. Deratizační stanice označte tak, aby bylo zřejmé, že obsahují rodenticidy a že nesmí být přemísťovány ani otevírány.

Při použití ve veřejných prostorech, označte ošetřené plochy po dobu deratizace a umístěte upozornění vysvětlující riziko primární nebo sekundární otravy antikoagulantem společně s uvedením opatření první pomoci v případě otravy. Nástrahu je třeba zajistit tak, aby jí nebylo možné z deratizační stanice odnáhat.

Mezi jednotlivými použitými neomyvejte deratizační stanice vodou. Umístěte přípravek mimo dosah dětí, ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných neclivých zvířat. Neumísťujte přípravek v blízkosti potravin, nápojů a krmiv ani nástrojů nebo povrchů, které s nimi přicházejí do kontaktu. Na konci období deratizace odstraňte zbývající nástrahu, deratizační stanice a pastí.

Dodatečná informace pro profesionální uživatele:
Pokud po 35 dnech deratizace dochází i nadále k požíráni nástrah a nezaznamenáte žádný

Distribuce a balení pro ČR: Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG,
Pfaffensteinstraße 1, 83115 Neubeuern, Germany, tel. +49(0)8035-90260, www.schopf-hygiene.de

SCHOPF
HYGIENE



Ratzia®

Bag B 25

Rodenticidní návnada ve formě pasty v sáčcích na hubení potkanů a myši v interiéru a exteriéru kolem budov

pokles aktivity hlodavců, je nutné stanovit pravděpodobnou příčinu. Po vyloučení jiných možností je pravděpodobné, že hlodavci jsou rezistentní, zvažte tedy použití jiného rodenticidu, pokud je k dispozici, případně silnějšího antikoagulačního rodenticidu.

APLIKAČNÍ DÁVKA: Myš domácí v interiéru: 20 g až 40 g / deratizační stanici / 5 metrů.
Potkan obecný v interiéru: 100 g až 200 g / deratizační stanici / 5 metrů.

Myš domácí/potkan obecný v exteriéru kolem budov: myš domácí: 20 až 40 g / deratizační stanici; potkan obecný: 100 g až 200 g / deratizační stanici / 5 metrů.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

H373 Při prodloužené nebo opakované expozici může způsobit poškození orgánů (krev).
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni:

Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.

Účinná látka: 0,025 g/kg Brodifacoum. **Další obsažené látky:** barvivo, hořké látky
Číslo povolení: CZ-0019697-0000 **UFI:** H520-U02H-A009-CSK9



VAROVÁNÍ

Obsahuje rodenticidní pastu dávkovanou v drobných sáčcích o hmotnosti 20g.

Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby.

Držitel povolení:
Detia Freyberg GmbH

Obsah: 500 g



ZDE
ODLEPIT

Upozornění vzhledem ke specifickému použití přípravku :

Deratizační staničky je nutno kontrolovat s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Myš domácí v interiéru :

Kontrolujte jednou za 2 až 3 dny v počáteční fázi deratizace a následně nejméně jednou týdně.

Potkan obecný v interiéru :

Kontrolujte nejdříve za 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně.

Myš domácí/potkan obecný v exteriéru kolem budov :

Chraňte nástrahu před povětrnostními podmínkami (např. deštěm, sněhem atd.).

Umístěte deratizační staničky v prostorách, kde nehrozí záplavy. Kontrolujte u myši – nejméně každé 2 až 3 dny, u krysa a potkanů – nejdříve 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně. Vyměňte nástrahu v deratizační staničce, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami.

Údaje o preventivních opatřeních během používání :

Během manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice.

Při používání přípravku nejzte, nepijte a nekuřte. Po použití přípravku si umyjte ruce.

Aby se snížilo riziko sekundární otravy, v průběhu deratizace v častých intervalech (např. nejméně dvakrát týdně) vyhledávejte a odstraňujte uhynulé hlodavce. Uhynulá těla hlodavců musí být neškodně odstraněna zahrabáním na určeném místě nebo spálením na základě povolení Státní veterinární správy. Přípravky se nesmí používat déle než 35 dnů bez vyhodnocení stavu zamoření a účinnosti deratizace. Nepoužívejte antikoagulační rodenticidy jako stálé nástrahy (např. k prevenci zamoření hlodavci nebo k odhalení aktivity hlodavců.

Přípravek v balení určeném pro profesionální uživatele nesmí být dodáván široké veřejnosti!

Skladování : Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte v uzavřeném obalu a chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte na místech mimo dosah dětí, ptáků a domácích a hospodářských zvířat.

Odstraňování přípravku a jeho obalu :

Na konci deratizace zlikvidujte nepotřebovanou nástrahu i obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě. Evropský katalog odpadů : 20 01 21* Pesticidy, 07 04 13* Pevné odpady obsahující nebezpečné látky.

ÚDAJE O PRAVDĚPODOBNÝCH PŘÍMÝCH NEBO NEPŘÍMÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VEDLEJŠÍCH ÚČINCÍCH :

Tento přípravek obsahuje antikoagulační látku. Při jeho požití se mohou objevit příznaky, a to i se zpožděním, mezi něž může patřit krvácení z nosu a z dásní. V závažných případech se mohou vyskytnout i krevní výrony a ve stolici a moči se může objevit krev.

Antidotum : Vitamin K1 podávaný pouze zdravotnickými / veterinárními pracovníky.

Pokyny pro první pomoc :

Při zasažení kůže omyjte pokožku vodou a následně vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vypláchněte oči roztokem na vyplachování očí nebo vodou a udržte víčka otevřená po dobu nejméně 10 minut.

Při požití vypláchněte ústa pečlivě vodou. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři ukažte obal nebo etiketu přípravku. V případě požití domácím zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře.

LÉKAŘSKÁ POMOC :

V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko :
Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích :
+420224919293 nebo +420224915402