



CZ **Disinfect Premium** je pěnivý, vysoce koncentrovaný přípravek pro plošnou dezinfekci stájí a stájového prostředí. Mimo vynikající fází odpařování, která způsobuje dezinfekci vzduchu, se **Disinfect Premium** vyznačuje i dlouhodobým a hlubinným účinkem proti bakteriím, plísňím a virům.

Přípravek je zapsán v seznamu Německé Veterinární Společnosti – DVG

Účinně eliminuje choroboplné zárodky a původec následujících nemocí:

Drůbež: Gumboro, Markova nemoc, aviární influenza (ptačí chřipka - H5N1), salmonelóza, Newcastleská nemoc, střevní infekce (kolibakterie), mykózy, ekzémy, stafylokokové, streptokokové, enterokokové a další.

Prasata: prasečí mor, Aujeszkyho nemoc, salmonelóza, dyzentérie (úplavice), parvovízra, entero-toxémie, virusová onemocnění, prasečí erysipel (červenka), PIA, APP, PRRS, MKS, rhinitis atrophicans (sípavka prasat), myco-plasma, Pasteurella multocida (cholera drůbeže), chřipka, klostridie a další.

Hovězí dobytek: slinivka a kulhavka, IBR/IPV, BVD/MD, hovězí chřipka a další.

Oblast použití: **Disinfect Premium** je vhodný pro dezinfekci ploch a stájového zařízení ve stájí hovězího dobytka, prasat, nosních slepic a jiné drůbeže, v kojské stáji, na jatkách, útulků pro zvířata, inkubátorů, inseminačních stanic, veterinárních stanic atd.

Disinfect Premium je šetrný k materiálu a proto se dá aplikovat i na beton, dřevo, plast a kovové plochy. Přípravek můžete aplikovat například na podlahy, zdí, technické zařízení, transportní zařízení a další.

Disinfect premium nemá negativní účinky pro bioplynové stanice!

Návod k použití a dávkování:

Před dezinfekcí je nutno plochu důkladně očistit. Poté zřeďte koncentrát podle následující tabulky a aplikujte 400ml na 1 metr čtvereční pomoci vysotolakového čističe, pěnové pistole, konvenční injekční stříkačky nebo mlhového zařízení.

Aby se dosáhlo maximálního dezinfekčního účinku, je důležité dodržet expoziční časy.

Doporučujeme plochy po dezinfekci opláchnout vodou. Po aplikaci zajistěte dostatečné větrání po dobu 10-12 hodin.

Aplikační koncentrace / minimální expoziční cas / aplikační množství:

Bakterie s výjimkou tuberkulózy:

Akutní dezinfekce	1%	2 hodiny	0,4 litry na m ²
Preventivní dezinfekce	0,5%	1 hodina	0,4 litry na m ²
Plísňe	1%	1 hodina	0,4 litry na m ²
Viry	1%	1 hodina	0,4 litry na m ²
omezená virucidní dezinfekce	1%	30 minut	0,4 litry na m ²


Další použití: Zamlžování: Zřeďte 1,5 litrů přípravku na 1 litr vody a přidejte

250 ml-500 ml příslušky pro zamlžování. Roztok je dostatečný pro 1000 m³.

Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele. Za následky neodborného použití neručíme.

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstraße 1 · 83115 Neubeuern · Germany · Tel +49(0)8035-90260 · www.schopf-hygiene.de

Disinfect Premium



Přípravek pro plošnou dezinfekci

- **pěnivý**
- **vysoce koncentrovaný**



SCHOPF
HYGIENE

První pomoc: Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský ohled nejméně 48 hodin po nehodě.

V případě vdechnutí zajistěte si přísnu čerstvého vzduchu a vyhledejte lékaře. V případě bezvědomí uložte postiženou osobu do stabilní polohy na boku. Při obtížném dýchání, zajistíte přívod kyslíku.

Při nepravidelném dýchání nebo zastaví poskytnout umělé dýchání. Neposkytujte umělé dýchání z úst do úst ani z úst do nosu. Zvratky mohou obsahovat jedovaté složky. Ihned vyhledejte lékaře.

V případě styku s kůží, ihned odstraňte kontaminovaný oděv. Kůži ihned opláchněte vodou a mydlelem. Je nutná okamžitá lékařská pomoc, protože neošetřené poletání má za následek pomalé hojení ran.

V případě zasažení očí potověte oční víčka a proplachujte oči pod tekoucí vodou po dobu 15 minut. Chrániť nezraněné oko. Ihned vyhledejte lékaře.

V případě požití vylápněte ústa a napijte se dostatečného množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Jestliže dojde k zvracení spontánně, pijte hodně vody. Ihned vyhledejte lékaře.

Informace pro lékaře: symptomatická léčba; Při plném podráždění se doporučuje léčba v první řadě s dexamethasonem-dosieraerosolem. (Dekontaminace, vitální funkce).

Číslo žárlé a doba použitelnosti: viz potisk.

Bezpečnostní pokyny: H290 Může být korozivní pro kovy. H301+H331 Toxicity při požití. Toxicity při vdechnování. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Způsobuje težké poletání kůže a poškození očí. H317 Může vytvárat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechnování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H341 Podezření na genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H371 Může způsobit poškození orgánů. H400 Vysoko toxicický pro vodní organismy. H411 Vysoko toxicický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P201 Před použitím si obstarajte speciální instrukce. P202 Nevdechujte prach/dým/plný/mlhá/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štit. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrne vylápněte vodu. Vymějte kontaktní čočky, souči-li nasazeny a pokud je lze vymontujte snadno. Políčte je vylepachováním. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svílejte.

Opláchněte kůži vodou/ospřírujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přenechte postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vylápněte ústa. NEVYVOLÁVÁTE zvracení. P308+P311 PŘI expoziцii nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P405 Skládajte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Účinné látky: 250 g/l Glutaral, 185 g/l Formaldehyd, 25 g/l Benzyl-(C12-C16)-alkyldimethylammoniumchloride

Nebezpečí určující látky: Glutaral, Formaldehyd, Methanol



Obsah: 1000 ml

UN 2922

